

AMBULATORIO DI PNEUMOLOGIA

Informazioni sull'utilizzo del BREEZHALER



Sfilare il cappuccio protettivo.

Aprire l'inalatore.

Tenendo l'inalatore per la base, ribaltare il boccaglio dell'inalatore per aprirlo.



Preparare la capsula.

Separare un singolo blister da una striscia, strappandolo lungo la linea perforata. Staccare la pellicola protettiva dalla parte posteriore del blister per poter estrarre la capsula.

estrarre una capsula dal blister, con le mani asciutte. Non deglutire la capsula.



Inserire la capsula nel vano per le capsule.

Chiudere l'inalatore.

Un clic indica che l'inalatore è completamente chiuso.



Mantenere l'inalatore in posizione verticale.

Premere entrambi i tasti una volta sola. Quando la capsula viene perforata, dovrebbe sentirsi un clic.

Premere i tasti per perforare la capsula una volta sola. Rilasciare i tasti.



Espirare: Prima di portare il boccaglio alla bocca, espirare completamente.

Inalare il medicamento.

Prima di inspirare, portare il boccaglio alla bocca e richiudere le labbra attorno a esso. Mantenere l'inalatore in modo tale che i tasti siano diretti verso sinistra e verso destra (e non verso l'alto e verso il basso).

Inspirare velocemente e costantemente, il più profondamente possibile. Non premere i tasti. Trattenerne il respiro per alcuni secondi.

Rimuovere la capsula dall'inalatore aprendolo e inclinandolo. Richiudere l'inalatore e rimettere il coperchio.

Informazioni elaborate dall'Ambulatorio di Pneumologia.

Studio presso: **POLIMEDICA BRIANZA Srl**, Via Ugo Foscolo 4, 20877 a Roncello (MB) - Tel.039/6957358

Mail: g.monzani@polimedicabrianza.it g.caiazzo@polimedicabrianza.it

Visita il nostro sito: www.ambulatoriodipneumologia.it